

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Tissu osseux


**Dr FELILISSA
M.A.B FEDALA N.
Dr ALLOUN**

Tissu osseux

1. -Généralités
 2. - constitution du tissu osseux
 - 1-cellules
 - 2-fibres
 - 3-Substance fondamentale
- ## III conclusion

I. INTRODUCTION

- Forme spécialisée de tissu conjonctif dont la **MEC** est **calcifiée**
- Le tissu osseux est un constituant essentiel de l'appareil squelettique.




Plus de cours sur : www.la-faculte.net


Le tissu osseux constitue la charpente du corps, forme les pièces osseuses

le tissu osseux est très vivant et en perpétuels remaniements tout au long de la vie.

- Fonction mécanique
 - Soutien
 - Protection
- Fonctions métaboliques (métabolisme phosphocalcique)
- Fonction hématopoïétique



CLASSIFICATION DE L'OS SELON LEUR FORME



Caractéristiques générales du système osseux

- Types d'os
 - **Os longs** : fonction de levier
 - **Os plats** : fonction de protection
 - **Os courts** : relier une partie du squelette à une autre
 - **Os sésamoïdes** : petits os ronds enfouis dans des tendons ou des capsules articulaires (ex: patella)
 - **Os irréguliers** (ex: vertèbres)

1. - constitution du tissu osseux

1-CELLULES

1.
-lignée ostéoblastique

cellules bordantes

Ostéoblastes

Ostéocytes

-lignée ostéoclastique : ostéoclastes

2- FIBRES

-collagène de type1

3-SUBSTANCE FONDAMENTALE

matrice organique

Matrice minéralisée


LES CELLULES du tissu osseux

Actions antagonistes et origines différentes

Formation du tissu osseux
Ostéoblastes et ostéocytes
Cellules bordantes
Origine mésenchymateuse


Destruction du tissu osseux
Ostéoclastes
Origine hématopoïétique
(lignée sanguine monocyttaire)

Cellules du tissu osseux



Cellules ostéoformatrices

Des cellules souches à potentialité ostéoformatrice existent chez l'adulte au niveau de la moelle osseuse et sont à l'origine d'un lignage de cellules impliquées dans la formation du tissu osseux




Les Ostéoblastes :

Cellules cubiques tapissant la surface
des pièces osseuses en cours de formation

Noyau ovalaire situé au pôle
opposé à celui où est élaborée
la MEC de type osseux

Cytoplasme basophile riche en
organites impliqués dans la
synthèse protéique

Nombreux prolongements
cytoplasmiques
s'enfonçant dans la MEC
(phosphatase alcaline ++)



OSTEOBLASTE. ME






Fig. 7.4

Ostéoblaste. ME.

A. Appareil de Golgi. B. Noyau d'un ostéoblaste. C. Réticulum endoplasmique granulaire. D. Canalicule (dans la matrice osseuse). E. Matrice osseuse.

Les ostéoblastes communiquent entre eux et avec les ostéocytes par des jonctions communicantes (Gap)

Ils synthétisent une MEC riche en fibres de collagène de type I qui ne se minéralise qu'à distance de la cellule (bordure ostéoïde)



Les ostéocytes

- sont des ostéoblastes totalement différenciés
- ont une activité réduite (échanges par les canalicules seulement)
- sont incapables de se diviser



Doivent être renouvelés régulièrement
ce qui impose la destruction du tissu osseux qui les entoure

Nécessité pour l'organisme de disposer de cellules
capable de résorber l'os : les **ostéoclastes**

OSTEOCYTE. ME




Fig. 7.5

Ostéocyte. ME.


A. Matrice osseuse. B. Jonction communicante entre deux prolongements cytoplasmiques d'ostéocytes. C. Ostéoplaste. D. Corps cellulaire d'un ostéocyte.

Les ostéoclastes


Seules cellules capables de résorber une MEC minéralisée
Localisation : dans les lacunes de Howship

Volumineuses cellules
de 50 à 100 μm de diamètre
multinucléées
(30 à 50 noyaux par cellule)

Cellules d'origine
hématopoïétique :
origine commune avec les
cellules de la lignée
monocytes/macrophages




OSTEOCLASTE. ME.



A. Matrice osseuse calcifiée. B. Chambre de digestion.


C. Microvillosité de la bordure en brosse. D. Lysosome. E. Un des multiples noyaux.


Les ostéoclastes se fixent sur la matrice osseuse comme des ventouses grâce à des intégrines spécifiques reconnaissant le motif Arginine-Glycine-Aspartate




Anneau périphérique de scellage et création d'une chambre étanche (lacune de Howship) dans laquelle l'ostéoclaste émet de très nombreuses microvillosités (bordure en brosse)

Une fois fixés, les ostéoclastes vont résorber l'os à l'intérieur des lacunes de Howship







Après avoir creusé une lacune de 40 μ m de profondeur,
les ostéoclastes se déplacent pour une nouvelle phase
d'adhésion-résorption-migration
ou meurent par apoptose



Matrice extracellulaire calcifiée

L'os est le tissu le moins hydraté de l'organisme mais la MEC osseuse renferme quand même 50% d'eau

Les ostéoblastes synthétisent la MEC qui ne se minéralise qu'à distance de la cellule (bordure ou tissu ostéoïde)



LA MATRICE EXTRACELLULAIRE

- **La matrice organique**

- Représente 30% de la masse osseuse
- Protéines fibreuses structurales (collagène) ou adhérentes (fibronéctine)
- Substance interfibrillaire : Glycosaminoglycanes , protéoglycanes et protéines non collagéniques.

- **La matrice inorganique**

- Représente 70% de la masse osseuse
- Les sels minéraux : calcium (27%) et le phosphore (12%)

Canaliculi

Phase organique

Osteoblasts

Osteocytes

Protéoglycanes en faible quantité

Collagène I ++

Ostéonectine
(liaison ++ avec le collagène et la phase minérale)
Croissance des cristaux

Ostéocalcine

Protéine non collagénique la plus importante
(liaison avec la phase minérale)
Marqueur de l'ostéoformation
Stimulation des ostéoclastes

Ostéopontine
(liaison cellules osseuses-
phase minérale, fixation
des ostéoclastes)

Thrombospondine
(liaison cellules osseuse-
MEC via les intégrines)

Sialoprotéines

IV. LES ENVELOPPES OSSEUSES

- Le Périoste
- L' Endoste


IV. LES ENVELOPPES OSSEUSES

- **Le Périoste**

- En dehors des zones au contact du cartilage articulaire et de l'insertion des ligaments,

le tissu osseux est recouvert par une **gaine conjonctive :**
le périoste


- Enveloppe externe
- Très vascularisée
- Constituée de deux couches : Périoste fibreux
Périoste cellulaire



PERIOSTE


Celui-ci est constitué de 2 couches:

- une couche interne, ou **cellulaire**, où des cellules peuvent se transformer en ostéoblastes
- une couche externe **fibreuse** faite de tissu conjonctif dense. Les fibres de collagène forment des faisceaux arciformes qui traversent la couche interne et vont s'ancrer dans le tissu osseux sous-jacent :
les fibres de Sharpey




- L'Endoste
- Tapisse l'os compact adjacent à la cavité médullaire, les travées osseuses d'os spongieux et les canaux de Havers.

ENDOSTE




Contactez nous sur




facadm16@gmail.com

à votre service inshallah

1 - Structure d'un os long en cours de croissance




2 - Structure d'un os court.




2.

3 - Structure d'un os plat de la voute du crâne.




3.

4- Les cellules du tissu osseux





5. **Ultra structure
de
l'ostéoblaste**





6. **Ultra structure de
l'ostéocyte**



7. **Ultra structure de
l'ostéoclaste**

Pathologies du tissu osseux


- Fracture
- Fracture de fatigue



1. CONCLUSION

- Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé de consistance dure et dont la MEC est calcifiée.
cette caractéristique la rend opaque aux rayons X,
ce qui permet l'analyse morphologique par la radiographie .
- La MEC osseuse contient deux phases : une phase minérale (responsable de la calcification) et une phase organique avec de très nombreuses protéines.
- l'os est un tissu vivant dont les fonctions sont multiples (soutien mécanique du corps, stockage du calcium, hématopoïèse).

Tissu osseux (suite)



Dr. ADJOURI
Mlle YOUYOU

Plan:

I- Introduction

II- Classification des tissus osseux

a-Tissu osseux réticulaire = non lamellaire

b-Tissu osseux lamellaire

1-Tissu osseux périostique

2-Tissu osseux haversien dense ou compact

3-Tissu osseux haversien aréolaire ou spongieux

III- Ossification


IV-Pathologies

V-Effets hormonaux et nutritionnels

I- Introduction

- Une pièce osseuse est caractérisée par trois types de tissus ; le tissu **conjonctif**, le tissu **cartilagineux** et le tissu **osseux**.
- Il y a deux types de tissus conjonctifs ; le périoste et l'endoste. (Les enveloppes osseuses TD1) .
- Il y a deux types de cartilage ; **le cartilage articulaire et le cartilage de conjugaison** .
- Il y a deux types de **tissus osseux lamellaire et non lamellaire** ;

Le tissu conjonctif:




Structure du périoste


- 1 - couche externe tendiniforme vascularisée
- 2 - couche interne ostéogène d'Ollier
- 3 - périoste
- 4 - tissu osseux périostique




Les os longs possèdent une cavité centrale
ou cavité médullaire
qui est bordée par une fine couche
de tissu conjonctif
ou endoste
contenant également des cellules
ostéoprogénitrices
(capables de se transformer en ostéoblastes)



Le tissu cartilagineux




Articulation du genou (vue de face du genou droit)



II- Classification des tissus osseux


- **Deux types** de T.O. en fonction de l'organisation du collagène au sein de la matrice osseuse :
 - le tissu osseux **réticulaire** ou **non lamellaire**
 - le tissu osseux **lamellaire**





Tissu osseux
lamellaire (L) et
réticulaire (R)
éosine,
G (x120)

a-Tissu osseux réticulaire = non lamellaire

- Tissu osseux primaire, faiblement minéralisé
- Trame collagénique orientée dans toutes les directions
- Aspect d'os « tissé » en MO en lumière polarisée
→ mécaniquement fragile



- Foetus : ébauches osseuses
 - Adulte :
 - osselets oreille moyenne et alvéoles dentaires
 - cals de fractures
 - reste des os : remplacé par T.O. secondaire
- T.O. provisoire




b-Tissu osseux lamellaire

- Tissu osseux secondaire, formé à partir du T.O. primaire
- Fibres de collagène parallèles, formant des lamelles
→ mécaniquement solide

3 types :


- Tissu osseux **périostique**
- tissu osseux lamellaire **haversien dense**
- tissu osseux lamellaire **haversien aréolaire** ou **spongieux**



Les 3 types de T.O. **coexistent** dans:

- os longs (humérus, fémur,...),
- os courts (carpes, tarses, vertèbres ,...),
- et os plats (côtes,...).


- **Os
longs :**



- **Os courts :**

- même organisation mais prédominance de T.O. spongieux

tissu osseux spongieux




↑
os compact

↑
os trabéculaire

↑
os compact

• Os plats :

- T.O. spongieux forme le **diploé**
- T.O. compact forme les **tables interne et externe**




1-Tissu osseux périostique

- A la périphérie des pièces osseuses des os long (sauf: surfaces articulaires et autour de la cavité médullaire),
- Il constitue la table interne et externe des os plat et l'enveloppe des os courts.

2-Tissu osseux haversien dense ou compact


- L'os compact constitue la diaphyse des os longs, l'enveloppe des os plats. Il constitue une enveloppe résistante
 - Composé de la juxtaposition de structures appelées **ostéones**.
 - structures cylindrique, $\varnothing = 200$ à $300 \mu\text{m}$
 - La longueur variant selon l'os,
 - bordés par la **ligne cémentante**
 - ils sont alignés parallèlement à la diaphyse

- 8-15 lamelles osseuses concentriques
 - présence de fibres de collagène à l'intérieur des lamelles de façon **parallèles**.
 - Direction se modifie de **90°** dans chaque lamelle successive
- **solidité optimale + certaine flexibilité**




- Présence d'un canal central = **canal de Havers** de \varnothing variable (20-100 μ m)
- contient 1 capillaire sanguin et 1 fibre nerveuse amyélinique
- tapissés par cellules bordantes
- Tous les canaux de Havers de la diaphyse sont reliés les uns aux autres par des canaux transversaux (perpendiculaires à l'axe de la diaphyse) : **canaux de Volkmann**.

- $\varnothing > \varnothing$ canaux Havers
- Ne sont pas entourés de lamelles concentriques
- Ils sont tapissés par des cellules bordantes



Entre ostéones : **systèmes interstitiels**

– lamelles d'ostéones anciens détruits pendant la croissance et le remodelage



1. Ligne cimentante

2. Ostéone

3. Canal de Havers

4. Système interstitiel de lamelles


Contactez nous sur

facadm16@gmail.com

à votre service inchaallah

Lamelles osseuse concentriques

- en périphérie : **système fondamental externe**
- côté interne : **système fondamental interne**




3-Tissu osseux haversien aréolaire ou spongieux


- **Trabécules** de tissu osseux **lamellaire** ramifiés et anastomosés
- Ostéocytes dans les ostéoplastes
- Cellules bordantes en surface

Espaces inter communicants occupés par **moelle osseuse** et vaisseaux


- Production d' éléments figurés du sang.



b) Agrandissement de travées d'os spongieux




Coupe transversale d'un système de havers




Coupe transversale au niveau du T O Haversien Dense.



Coupe longitudinale au niveau de l'épiphyse



12. Structure d'un système de havers.



1 - Ostéocyte, 2 - S F E, 3 - périoste, 4 - lamelles, 5 - canal de walkman, 6 - nerfs, 7 - capillaire sanguin, 8 - canal de havers, 9 - T O H Dense, 10 - endoste, 11 - Cavité médullaire, 12 - système de havers en coupe longitudinale, 13 - S F I, 14 - système de havers en coupe transversale.

Coupe transversale au niveau de la diaphyse

III- Ossification

- Les pièces osseuses se forment de deux façons:
 - 1/ ossification **primaire**:
 - soit à partir d'un **tissu conjonctif** très riche en collagène:
ossification **endoconjonctive**
 - soit à partir du **cartilage** : ossification **endochondrale**
 - 2/ ossification **secondaire**:
 - soit une couche de **tissu osseux déjà formé**

- Un **os plat** est constitué de 2 tables d'os lamellaire séparées par une couche d'os spongieux = **diploé**.
- Un **os court** est formé d'une masse spongieuse entourée d'une fine gaine d'os compact.

Les os plats et courts sont d'origine **uniquement mésenchymateuse** donc leur os compact et leur os spongieux sont issus de **l'ossification endoconjonctive**.

- **Un os long** est anatomiquement constitué :
- D'une diaphyse (cylindre d'os compact autour d'une cavité médullaire, enveloppé de périoste).
- De 2 épiphyses (en général) = nodule d'os spongieux enveloppé d'os compact et de périoste (sauf dans la région articulaire).
- Et de métaphyses qui relient l'épiphyse à la diaphyse.

Origine endochondrale et endoconjonctive

IV-Pathologies

- ↓ œstrogènes (ménopause) : perte densité minérale T.O. → **ostéoporose**
- mutation gène collagène I → **ostéogénèse imparfaite (maladie des os de verre)**
- remodelage trop important (adulte) → **maladie de Paget**

Ostéoporose



Normal



Paget's disease



V-Effets hormonaux et nutritionnels

- somatotrophine (hormone de croissance) :
 - carence (enfance) → **nanisme**
 - excès (enfance) → **gigantisme**
 - excès (adulte) → **acromégalie** (épaississement des os de la face)
- hormones sexuelles (œstrogènes et androgènes) :
 - développement sexuel précoce → **arrêt croissance**
 - déclin chez sujet âgé → **fragilisation T.O.**
- carence en vitamine D (enfants) → **rachitisme**
- carence vitamine C → **retard de croissance et de consolidation des fractures**

Le développement commence à partir des membranes fibreuses.

- 1- Dans ces membranes se forment des agrégats de cellules mésenchymateuses, et les membranes deviennent vascularisées(V)
- 2- Une partie des cellules mésenchymateuses se transforment en cellules ostéoprogénitrices (OP) qui forment des ostéoblastes (ob)
- 3- Les ostéoblastes sécrètent la matrice, ils deviennent emprisonnés dans cette matrice et se transforment en ostéocytes, de cette manière se forment les spicules osseux.
- 4- De nouvelles cellules mésenchymateuses forment des cellules ostéoprogénitrices(OP). Lorsque ces cellules viennent en contact avec les spicules osseux(S), elles se transforment en ostéoblastes (ob) qui produisent de la matrice osseuse. De cette manière, les spicules(S) s'élargissent "**croissance par apposition**". Les spicules se joignent pour former un réseau